

# После эндолонтического лечения

Лечение корневых каналов – это серьезное стоматологическое вмешательство, позволяющее сохранить зуб. Оно заключается в удалении инфицированных тканей из канала, механической, медикаментозной, ультразвуковой обработки каналов и пломбировании канала(ов) лечебным(временным) или постоянным материалом.

**Чтобы лечение прошло наиболее комфортно, важно соблюдать рекомендации Вашего лечащего врача**

1. Эндолонтическое лечение проводится под обезболиванием. Онемение на верхней челюсти может сохраняться от 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше – от 2-4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Постарайтесь в это время не принимать пищу, чтобы не повредить (прикусить) мягкие ткани щеки, языка, губ.
2. После прекращения действия анестезии могут возникнуть ноющие боли и (или) болезненность при накусывании на зуб. Это связано с естественной биологической реакцией организма на вмешательство

и наличие лечебного или пломбировочного материала в канале(ах) зуба, а также зависит от степени уже имеющегося на момент Вашего обращения воспаления в тканях, окружающих корни. Эти ощущения могут сохраняться на протяжении нескольких суток.

### **РЕКОМЕНДУЕМ НА ЭТОТ ПЕРИОД:**

- Ограничить жевательную нагрузку на пролеченный зуб.
- При необходимости можно принять таблетку болеутоляющего средства, рекомендованного врачом.
- В течении 5-10 дней болевые ощущения проходят.



Если боль усиливается, появляется отек, поднимается температура, необходимо обратиться в клинику по телефону: +7 (495) 120-65-75 и записаться на приём к Вашему лечащему врачу.

**3.** Нельзя греть область в которой проводилось лечение корневых каналов.

- Исключить в первые сутки после манипуляции прием горячей пищи и горячих напитков.
- Исключить на 7-14 дней посещение: бани\сауны\ солярия; не принимайте горячую ванну во избежание отрицательной динамики лечения.

**4.** В случае поэтапного эндодонтического лечения зуб может быть покрыт временной пломбой до следующего Вашего визита в клинику. Рекомендуем не употреблять пищу на протяжении первых 2-х часов после лечения до ее полного отвердения, а также снизить жевательную нагрузку на пролеченный зуб в течение всего периода

лечения. Временная пломба может незначительно крошиться при жевании и может ощущаться непривычный привкус во рту.

**Если временная пломба выпала, необходимо закрыть полость ватным шариком и обратиться к лечащему врачу, позвонив в клинику по номеру телефона 8(495) 120-65-75, чтобы предотвратить попадание инфекции в корневые каналы.**

5. Настоятельно рекомендуем не прерывать установленный лечащим врачом график поэтапного эндодонтического лечения, так как каждый этап соответствует временным протоколам лечения.
6. После проведенного эндодонтического лечения коронковая часть зуба ослаблена. Для исключения образования сколов, трещин, перелома корня зуба, что по абсолютным медицинским показаниям потребует удаления, рекомендуется восстановление зуба ортопедической конструкцией в сроки, оговоренные Вашим лечащим доктором. Это позволит герметично закрыть доступ к корневым каналам, предотвратить их повторное инфицирование, укрепить ослабленные стенки зуба, полностью восстановить форму зуба и функцию жевания в целом.

**Мы всегда рядом** ❤️

При любых вопросах, сомнениях или ощущениях – не стесняйтесь связываться:

---

телефон:

+7 495 120 65 75

whatsapp:

+7 926 403 84 44